

Combustin[®] mit der Naturheilmarke
Pharmazeutische Präparate GmbH **P**
Tresselin[®]



Combustin pharmazeutische
Präparate GmbH
Offingerstr. 7
88525 Hailtingen
Tel: 07371 – 96 53 56
Fax: 07371 – 96 53 58

Produktinformationen: Rufebran rheumo Ampullen
PZN 10 Ampullen: 01085211
PZN 100 Ampullen: 01085234

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören: Besserung rheumatischer Gelenkbeschwerden.
Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, bei Fieber, das länger als drei Tage bestehen bleibt oder über 39°C ansteigt sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Zusammensetzung:

1 Ampulle zu 1 ml enthält: Wirkstoffe:
Acidum formicicum Dil. D6 0,25 ml
Ammonium phosphoricum Dil. D10
[HAB, V.5a; Lsg. D2 mit Ethanol 15% (m/m)] 0,25 ml
Silicea Dil. D12 0,25 ml
Sulfur Dil. D12 0,25 ml

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet:
Bei akuten Zuständen parenteral 1-2 ml bis zu 3mal täglich subcutan injizieren. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen parenteral 1-2 ml täglich subcutan injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.
Das Arzneimittel sollte wegen nicht ausreichender Untersuchungen nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit und auch nicht bei Kindern unter 12 Jahren angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.
In der Gebrauchsinformation wird auf Folgendes hingewiesen: "Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit".

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.