

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information

Januar 2005

Weitere Informationen über Koro-Nyhadin Filmtabletten:

Was bedeutet "Nachlassende Leistungsfähigkeit des Herzens entsprechend Stadium II nach NYHA" ?

Die "New York Heart Association" (NYHA), eine renommierte medizinische Fachgesellschaft, hat die Leistungsschwäche des Herzens entsprechend dem Grad der Beschwerden in 4 Stadien eingeteilt. Stadium II nach NYHA bedeutet, dass bei normaler bis mittlerer körperlicher Belastung eine leichte Einschränkung der Leistungsfähigkeit vorliegt und Beschwerden auftreten wie rasche Ermüdbarkeit und Kurzatmigkeit. Nur in diesem Stadium sind Koro-Nyhadin[®] Filmtabletten angezeigt.

Was sind Koro-Nyhadin[®] Filmtabletten ?

Koro-Nyhadin Filmtabletten enthalten einen qualitativ hochwertigen Extrakt aus Weissdornblättern mit Blüten. Die Dosierung mit 2 mal täglich 1 Filmtablette stellt eine Tagesdosis von 900 mg Extrakt aus Weissdornblättern mit Blüten sicher.

Diese Tagesdosis ist für die Behandlung im Stadium II nach NYHA erforderlich und sollte über längere Zeit eingenommen werden. In regelmäßigen Abständen sollte der Arzt aufgesucht werden zur Überwachung der Behandlung.

Die Filmtabletten sollen unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit eingenommen werden. Falls dies Schwierigkeiten bereitet, steht Koro-Nyhadin[®] auch in flüssiger Form zur tropfenweisen Einnahme zur Verfügung.

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

**KORO
NYHADIN[®]**

Filmtabletten 450 mg



Wirkstoff: Weißdornblätter- mit -Blüten-Trockenextrakt

Zusammensetzung:

1 Filmtablette enthält als arzneilich wirksamen Bestandteil:
450 mg Trockenextrakt aus Weißdornblättern mit Blüten (4 - 7 : 1).
Auszugsmittel: Ethanol 45 % (V/V)

Sonstige Bestandteile:

Maltodextrin, Hochdisperses Siliciumdioxid, Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat, Hypromellose, Macrogol, Talkum, Farbstoffe Titandioxid und Eisenoxid.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackungen mit 40 und 100 Filmtabletten

Stoff- oder Indikationsgruppe

Pflanzliches Arzneimittel bei Herzerkrankungen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Robugen GmbH Pharmazeutische Fabrik
Alleenstr. 22-26 73730 Esslingen
Tel. 0711-13630-0 Fax: 0711-367450
Email: info@robugen.de Internet: www.robugen.de

Anwendungsgebiete

Nachlassende Leistungsfähigkeit des Herzens entsprechend Stadium II nach NYHA.

Bei unverändertem Fortbestehen der Krankheitssymptome über sechs Wochen oder bei Ansammlungen von Wasser in den Beinen ist eine Rücksprache mit dem Arzt zu empfehlen. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot ist eine sofortige ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Koro-Nyhadin Filmtabletten nicht anwenden?
Das Arzneimittel darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Weißdorn oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels nicht eingenommen werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
Aus der verbreiteten Anwendung von Weißdorn als Arzneimittel haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken in Schwangerschaft und Stillzeit ergeben. Ergebnisse experimenteller Untersuchungen liegen nicht vor. Daher sollten Koro-Nyhadin Filmtabletten in Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu berücksichtigen?
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Koro-Nyhadin Filmtabletten sollen deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?
Besondere Vorsichtshinweise für den Gebrauch:
Keine.

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?
Entfällt.

Wechselwirkungen

Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung von Koro-Nyhadin Filmtabletten?
Keine bekannt.

Welche anderen Medikamente werden in ihrer Wirkung von Koro-Nyhadin Filmtabletten beeinflusst?
Keine bekannt.

Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?
Entfällt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Koro-Nyhadin Filmtabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Koro-Nyhadin Filmtabletten sonst nicht richtig wirken können!

Wie oft und in welchen Mengen sollten Sie Koro-Nyhadin Filmtabletten anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre 2 mal täglich 1 Filmtablette mit reichlich Flüssigkeit ein.

Wie und wann sollten Sie Koro-Nyhadin Filmtabletten anwenden?
Die Filmtabletten werden unzerkaut zu den Mahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit eingenommen.

Wie lange sollten Sie Koro-Nyhadin Filmtabletten anwenden?
Es wird empfohlen, Koro-Nyhadin Filmtabletten mindestens 6 Wochen und höchstens 6 Monate einzunehmen. Danach sollte der behandelnde Arzt die weitere Anwendungsdauer festlegen.
Beachten Sie bitte auch die ergänzenden Angaben unter "Anwendungsgebiete".

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Koro-Nyhadin Filmtabletten in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigt oder versehentlich)?
Da es sich hier um ein mild wirkendes Arzneimittel handelt sind Sofortmaßnahmen in der Regel nicht erforderlich. Informieren Sie jedoch in jedem Fall Ihren Arzt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Koro-Nyhadin Filmtabletten angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?
Die Anwendung sollte entsprechend der Dosierungsanleitung, d.h. ohne zusätzliche Einnahme, fortgeführt werden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?
Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich. Im Zweifelsfall befragen Sie hierzu Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung Koro-Nyhadin Filmtabletten auftreten?
Selten können Magen-Darm-Beschwerden, Schwächegefühl oder Hautausschlag auftreten. Diese Beschwerden klingen in der Regel nach Absetzen des Arzneimittels innerhalb weniger Tage ab.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?
Bei auftretenden Nebenwirkungen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.