

Gebrauchsinformation

Temmler Pharma GmbH & Co. KG
Temmlerstraße 2 · 35039 Marburg
Telefon (06421) 494-0



TEMMLER PHARMA

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Endo-Paractol®

Wirkstoff: Simeticon

Zusammensetzung

100 ml Emulsion enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Simeticon 0,526 g

Sonstige Bestandteile:

Macroglycerolricinoleat (Ph. Eur.), Propylenglycol, Aromastoff, Saccharin-Natrium 2 H₂O, Formaldehyd-Lösung 35%, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 180 ml, Großpackung mit 1080 ml Emulsion

Entschäumer

Pharmazeutischer Unternehmer:

Temmler Pharma GmbH & Co. KG
Temmlerstraße 2
35039 Marburg
Telefon 06421/494-0
Telefax 06421/494-201

Hersteller:

Pharbil Waltrop GmbH
Im Wirrigen 25
45731 Waltrop

Anwendungsgebiete

- Zur diagnostischen Vorbereitung im Bauchbereich (Beseitigung von Schaumansammlungen), wie z. B. bei einer Ösophagoskopie, Gastroskopie, Duodenoskopie, Jejuno-Ileoskopie, Rektoskopie, Sigmoidoskopie, Koloskopie.

- Doppelkontrastdarstellung des Magens oder Doppelkontrastdarstellung des Dickdarms

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Endo-Paractol nicht anwenden?

Gegenanzeigen sind bisher nicht bekannt.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Endo-Paractol während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Was müssen Sie vor der Anwendung von Endo-Paractol beachten?

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Endo-Paractol ist erforderlich.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Endo-Paractol:

Enthält Formaldehyd und Macroglycerolricinoleat.

Formaldehyd und Macroglycerolricinoleat können Magenverstimmung und Durchfall hervorrufen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Endo-Paractol oder werden durch dieses Medikament beeinflusst?

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimittel sind nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Endo-Paractol nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Endo-Paractol sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel von Endo-Paractol sollten Sie anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, 10 ml Endo-Paractol (entsprechend 52,6 mg Simeticon) vor oder während der Endoskopie.

Bei Bedarf kann die Dosis erhöht werden.

Bei Doppelkontrastdarstellung des Magens:

10 ml Endo-Paractol (entsprechend 52,6 mg Simeticon) auf 150-250 ml Kontrastbrei.

Bei Doppelkontrastdarstellung des Dickdarms:

20 ml Endo-Paractol (entsprechend 105,2 mg Simeticon) auf 1000-1500 ml Kontrastbrei.

Zur genauen Dosierung von Endo-Paractol ist der beigelegte Messbecher zu verwenden.

Wie und wann sollten Sie Endo-Paractol anwenden?

Endo-Paractol kann sowohl unverdünnt als auch in einem verdünnten Verhältnis mit Wasser durch den Biopsiekanal des Endoskops gegeben, als auch vom Patienten eingenommen werden.

Endo-Paractol ist sowohl in der konzentrierten Form als auch nach dem Verdünnen vor der Verabreichung jeweils kräftig zu schütteln.

Zur Reinigung des Biopsiekanals des Endoskops wird lauwarmes Wasser empfohlen.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Der Wirkstoff von Endo-Paractol bringt den Schaum im Magen-Darm-Kanal auf rein physikalischem Wege zur Auflösung und ist chemisch und biologisch vollkommen unwirksam.

Deshalb ist eine Vergiftung praktisch ausgeschlossen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Endo-Paractol auftreten?

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Endo-Paractol wurden bisher nicht beobachtet. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Behältnis und der Faltschachtel aufgedruckt.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch der Flasche kann Endo-Paractol 1 Jahr verwendet werden.

Nicht über 25°C aufbewahren.

Stand der Information

Februar 2003

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren!

Endo-Paractol® ist apothekenpflichtig

Temmler Pharma wünscht Ihnen gute Besserung!

Endo-Paractol®

ist eine spezielle Zubereitungsform für die Endoskopie. Es enthält als Wirkstoff Simeticon, das Schaumansammlungen im Magen-Darm-Trakt sofort beseitigt.