

# Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## FORTAKEHL® D5 Flüssige Verdünnung

Homöopathisches Arzneimittel · Wirkstoff: **Penicillium roquefortii D5**

### Zusammensetzung:

10 ml enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

10 ml **Penicillium roquefortii D5** dil. (HAB, Vorschrift 5a).

**Darreichungsform und Inhalt:** 10 ml / 100 ml flüssige Verdünnung zum Einnehmen, Einreiben und Inhalieren.



### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

**SANUM-KEHLBECK**  
GmbH & Co. KG

Arzneimittelherstellung  
Postfach 1355 · D-27316 Hoya

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Hinweis an den Anwender:** Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen soll medizinischer Rat eingeholt werden.

**Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

Siehe unter Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte **FORTAKEHL® D5** in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Hinweis:** Bei Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (*Penicillium roquefortii*) fragen Sie Ihren Arzt.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

**Allgemeiner Hinweis:** Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

**Wieviel und wie oft sollten Sie FORTAKEHL® D5 anwenden?**

Soweit nicht anders verordnet:

**Zum Einnehmen:** Einmal täglich 8 Tropfen vor einer Mahlzeit.

**Zum Einreiben:** a) Einmal täglich 5 – 10 Tropfen in die Ellenbeuge einreiben.  
b) bei Injektionsbehandlung an den injektionsfreien Tagen zweimal wöchentlich 5 – 10 Tropfen.

**Zum Inhalieren:** 2 – 3mal täglich 10 – 20 Tropfen tiefe Atemzüge.

**Wie lange sollten Sie FORTAKEHL® D5 anwenden?**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis:** Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! – Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. – Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. – Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

**Stand der Gebrauchsinformation:** 01. 03. 2002.

**Hinweis:** Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!



Trennung  
an der abstehenden  
Lasche  
anfassen  
und runderum  
abziehen.



Weiße Schutzkappe  
mit Daumen und  
Zeigefinger  
kräftig anfassen  
und zur Seite  
abknicken.



Tropfenweise Ent-  
nahme durch vor-  
sichtiges Zusammen-  
drücken der Gummipipette mit Daumen  
und Zeigefinger



Nach Gebrauch  
Schutzkappe fest auf-  
drücken bis sie hörbar  
einrastet. Hierdurch  
dichter Verschluss der  
Tropfflasche.

Zur weiteren Anwendung stehen **FORTAKEHL®** Injektionen, Kapseln, Tabletten und Zäpfchen zur Verfügung.