

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

RELIVORA® Komplex Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel · Flüssige Verdünnung

Zusammensetzung:

In 1 ml flüssiger Verdünnung sind an arzneilich wirksamen Bestandteilen enthalten:

Drosera D3 dil. 25,0 µl

Echinacea angustifolia D2 dil. 2,5 µl

Juglans regia (HAB 1934) **D4** dil. 250,0 µl

(HAB, Vorschrift 3a)

Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Alkohol

Darreichungsform und Inhalt: 30 ml / 100 ml flüssige Verdünnung zum Einnehmen.



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-KEHLBECK

GmbH & Co. KG

Arzneimittelherstellung

Postfach 1355 · D-27316 Hoya

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie RELIVORA® Komplex nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmunerkrankungen.

Wann dürfen Sie RELIVORA® Komplex erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Bei Alkohol- und Lebererkrankungen sollte aufgrund des Alkoholgehaltes das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte **RELIVORA® Komplex** in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweise: Dieses Arzneimittel enthält 28 Vol. % Alkohol.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von RELIVORA® Komplex und wie oft sollten Sie RELIVORA® Komplex anwenden? Soweit nicht anders verordnet nehmen Erwachsene und Kinder über 14 Jahre 3 mal täglich 20 bis 25 Tropfen unverdünnt. In akuten Fällen: zweistündlich 15 Tropfen bis zu 6 mal täglich. Kinder zwischen dem 6. und 14. Lebensjahr erhalten die Hälfte der Erwachsenen dosierung. Bei Kleinkindern ist die Dosierung individuell zu treffen.

Wie und wann sollten Sie RELIVORA® Komplex einnehmen? Die Tropfen sind unverdünnt einzunehmen und einige Zeit im Mund zu belassen. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten und darf auch bei nüchternem Magen erfolgen.

Wie lange sollten Sie RELIVORA® Komplex einnehmen? Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Eine zeitliche Begrenzung der Anwendung ist nicht vorgesehen. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Halten Sie sich auch dann an die Anwendungsvorschriften, wenn Sie sich bereits nach kürzerer Zeit besser fühlen. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung: Was ist zu tun, wenn RELIVORA® Komplex in zu großen Mengen angewendet wurde? Von den homöopathischen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten.

Nebenwirkungen: In Einzelfällen könnten Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. – Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels.

Stand der Gebrauchsinformation: 01. 08. 2000.

Hinweis: Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Apothekenpflichtig!

Packungsgrößen: Tropfflasche zu 30 ml, 100 ml.



Trennung
an der abstehenden
Lasche
anlassen
und nachherum
abziehen.



Weißer Schutzkappe
mit Daumen und
Zeigefinger
kräftig anlassen
und zur Seite
abknicken.



Tropfenweise Ent-
nahme durch vor-
sichtiges Zusammen-
drücken der Gummipi-
pette mit Daumen
und Zeigefinger



Nach Gebrauch
Schutzkappe fest auf-
drücken bis sie hörbar
einrastet. Hierdurch
dichter Verschluss der
Tropfflasche.

Zur weiteren Anwendung stehen RELIVORA®-Injektionen zur Verfügung.